

醫生提提你： 舒緩鼻敏感話咁易

大人細路都啱用*

- ✓ 無藥味、無倒流²
- ✓ 每日一次，藥效持續24小時¹
- ✓ 藥霧可直達鼻腔，針對敏感根源部位²

 英國製造

請向醫生/醫護人員查詢有關詳情。商標為葛蘭素史克集團擁有或經授權使用。© 2020 葛蘭素史克集團或其授權人。
如需呈報不良藥物反應，請致電香港(852) 3189 8989與葛蘭素史克有限公司聯絡。您亦可電郵到HKAdverseEvent@gsk.com以報告不良反應。

Reference: 1. Avamys Hong Kong Full Prescribing Information (Version GDS10/PI0920151109). 2. Berger BE, Godfrey JW, Slater AL. Intranasal corticosteroids: Expert Opin. Drug Deliv 2007 4(6): 68-9-701.


Safety information: AVAMYS is contraindicated in patients with hypersensitivity to any of the ingredients. Adverse reactions: Epistaxis (the incidence of epistaxis was higher in longer-term use [more than 6 weeks] than in short-term use [up to 6 weeks] in adults and adolescents; in paediatric clinical studies of up to 12 weeks duration the incidence of epistaxis was similar between fluticasone furoate and placebo), nasal ulceration and headache. A reduction in growth velocity has been observed in children treated with fluticasone furoate 110 µg daily for 1 year. Therefore, children should be maintained on the lowest dose that delivers adequate symptom control.



葛蘭素史克香港 | 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈6座23樓

PM-HK-FLFLBND-200003 (Apr 2022)
Date of preparation: 21/05/2020

如何使用噴鼻劑



搖勻噴鼻劑，然後拔出塵蓋



垂直拿着噴鼻劑，並將噴嘴小心地放進其中一邊鼻孔



將噴嘴末端稍微向外，
用鼻吸氣時，按下按鈕一次



拿出噴嘴，並用口呼氣。
若果您的醫生告訴您，每邊鼻孔
噴2次的話，請重覆步驟2至4。

*2歲
或以上適用



另一邊鼻孔重覆步驟2至4，
使用後把塵蓋蓋回噴鼻劑。

注意事項：

- 檢查是否仍有藥物剩下。透過窗格看看藥物的剩餘水平。若果水平太低，剩餘的藥物未必足以令噴鼻劑正常運作。
- 檢查噴鼻劑是否有損壞。
- 使用噴鼻劑後，用清潔的乾紙巾拭擦即可

噴鼻劑使用教學短片



若果噴鼻劑未能正常運作，或所釋出的並非幼細噴霧(例如射出液體)，又或使用噴鼻劑時感到任何不適，請把噴鼻劑退回您的醫生或藥劑師。